Tezis®

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu

AKTIVNA SUPSTANCA: Metsulfuron - metil (600 g/kg preparata)

DELOVANJE: Metsulfuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina/koncentracija primene	Vreme primene
Pšenica, ječam	10 g/ha 10 g/ha + 0,1% okvašivača 10 g/ha + 0,4 l/ha preparata na bazi fluroksipir-meptila	tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista, pa do zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a korovi u fazi 2-4 lista

SPEKTAR DELOVANJA:

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

Prstenak poljski	*Anthemis arvensis*
Vidovčica crvena	*Anagalis arvensis*
Pepeljuga obična	*Chenopodium album*
Pepeljuga srcolisna	*Chenopodium hybridum*
Žavornjak obični	*Consolida regalis*
Mrtva kopriva crvena	*Lamium purpureum*
Vrapseme poljsko	*Lithospermum arvense*
Kamilica prava	*Matricaria chamomila*
Bulka obična	*Papaver rhoeas*
Šilj	*Pycris echiodes*
Gorušica poljska	*Sinapis arvensis*
Oranjica obična	*Sysimbrium sophia*
Kravlja trava	*Thlaspi arvense*

Višegodišnji širokolisni korovi:

Palamida	*Cirsium arvense*

Tezis® vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača:

Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih):

Vijušac njivski	*Bilderdykia convolvulus*
Dvornik ptičiji	*Polygonum aviculare*

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0,4 l/ha praparata na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC):

Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih):

Broćika lepuša	*Galium aparine*

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog proširenja delovanja na korov prilepaču *(Gallium aparine)* može se mešati sa preparatom **Bonaca EC**.

NAPOMENE: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti.
U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Pšenica, ječam	obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 10g