



Tezis® vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u pšenici i ječmu

AKTIVNA SUPSTANCA: Metsulfuron - metil (600 g/kg preparata)

DELOVANJE: Metsulfuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetoluktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina/koncentracija primene	Vreme primene
Pšenica, ječam	10 g/ha 10 g/ha + 0,1% okvašivača 10 g/ha + 0,4 l/ha preparata na bazi fluroksipir-meptila	tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista, pa do zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a korovi u fazi 2-4 lista

SPEKTAR DELOVANJA:

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha:

Jednogodišnji širokolistni korovi:

Prstenak poljski	<i>Anthemis arvensis</i>
Vidovčica crvena	<i>Anagallis arvensis</i>
Pepeljuga obična	<i>Chenopodium album</i>
Pepeljuga srodisna	<i>Chenopodium hybridum</i>
Žavornjak obični	<i>Consolida regalis</i>
Mrtva kopriva crvena	<i>Lamium purpureum</i>
Vrapseme poljsko	<i>Lithospermum arvense</i>
Kamilica prava	<i>Matricaria chamomilla</i>
Bulka obična	<i>Papaver rhoeas</i>
Šilj	<i>Pyrrhis echiodes</i>
Gorušica poljska	<i>Sinapis arvensis</i>
Oranjica obična	<i>Sysimbrium sophia</i>
Kravlja trava	<i>Thlaspi arvense</i>

Višegodišnji širokolistni korovi:

Palamida	<i>Cirsium arvense</i>
----------	------------------------



Tezis® vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača:

Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih):

Vijušac njivski *Bilderdykia convolvulus*
Dvornik ptičiji *Polygonum aviculare*

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0,4 l/ha prparata na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC):

Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih):

Broćika lepuša *Galium aparine*

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog proširenja delovanja na korov prilepaču (*Gallium aparine*) može se mešati sa preparatom **Bonaca EC**.

NAPOMENE: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Pšenica, ječam	obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 10g

