

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Αραβόσποτος: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-160 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά), και με 80-100 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας).

Ζαχαρότευτλα: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 80-130 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά).

BAMBAKI: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά), και με 100 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού προσταρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) **

Τομάτα: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού πριν από την μεταφύτευση της τομάτας.

Πατάτα: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια.

Καπνός: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. σκ./στρ. σε 30-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού πριν από την μεταφύτευση του καπνού.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1

Παρατηρήσεις:

** Στο βαμβάκι, προσταρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το BASAR συνιστάται να συνδυάζεται με COTORAN 90 WG.

1. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη. 2. Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφύτευμένες. 3. Στον αραβόσποτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

* Καταπολεμώμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Echinochloa crus-galli – ECHCG (μουχρίτσα), Digitaria sp. – DIGSS (αιματογόχορο), Setaria spp. – SETSS (σετάρια), Amaranthus spp. – AMASS (βλήτα), Solanum nigrum – SOLNI (αγριοντομάτι), Portulaca oleracea – POROL (γλυστριόδα), Lolium spp. – LOLSS (ήρα), Capsella bursa-pastoris – CAPBP (καφέλλα), Matricaria spp. – MATSS (χαμομήλι), Fumaria spp. – FUMSS (καπνόχορο).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Chenopodium album – CHEAL (λουβουδιά), Polygonum persicaria – POLPE (αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus – CYPEP (κίτρινη κίπερη), Stellaria media – STEME (στελλάρια).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. Η εφαρμογή του BASAR δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση) αλλά και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες): Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από: - 5 μέτρα από υδάτινες επιφάνειες - 10 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά για την καλλιέργεια του αραβόσποτου. - 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά για τις λοιπές καλλιέργειες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιιεργιών που ακολουθούν: Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περικεκτικότητας του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαλιέργητο εδαφος μακριά από πηγές νερού.

“Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί”

BASAR®

S-Metolachlor (σ-μετολαχλор) - Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

S-metolachlor 96 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 11,72 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης

στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

70.319/12.03.2019

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικιών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσποτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολοσόπιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζει τη διάτρηση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Κάτοχος της άδειας: Galenika-Fitofarmacija d.o.o.
Trzaska cesta 515, T.K. 1351 - Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής σκευάσματος: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.
Batajnicki drum bb, 11080 Belgrade Zemun, Σερβία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

registration@farmachem.gr - info@farmachem.gr



Ζιζανιοκτόνο



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο



FARMA-CHEM SA

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ** τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Χρησιμοποιήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν δεν υπάρχει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην ρυπώνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τον αραβόσποτο και 5 μέτρων για άλλες καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/καταστροφή του BASAR πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Συνδυαστικότητα: Στην πατάτα (Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το BASAR μπορεί να συνδυαστεί με το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσταρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το BASAR μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το BASAR μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Αραβόσποτος, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Πατάτα, Τομάτα:-

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

