

BASAR[®]

S-Metolachlor (σ-μετολαχλор) - Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)



Ζιζανιοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση:

S-metolachlor 96 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 11,72 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
70.319/12.03.2019

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπυλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Κάτοχος της άδειας: Galenika-Fitofarmacija d.o.o.

Trzaska cesta 515, T.K. 1351 - Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής σκευάσματα: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.

Batajnicki drum bb, 11080 Belgrade Zemun, Σερβία



FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΣΟΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

registration@farmachem.gr - info@farmachem.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
5 λίτρα

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.:
βλέπε επί της συσκευασίας



BASAR®



Ζιζανιοκτόνο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
5 λίτρα

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις ακεκυμάματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Αραβόσιτος: Για Ετήσια αργασιακή και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-160 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού προφυλακτικά (αυτόματη μετά τη σπορά), και με 80-100 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού νωρίς μετομορφικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας).

Ζαχαρότευτλα: Για Ετήσια αργασιακή και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 80-130 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού προφυλακτικά (αυτόματη μετά τη σπορά).

BAMBARI: Για Ετήσια αργασιακή και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού προφυλακτικά (αυτόματη μετά τη σπορά), και με 100 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού προφυλακτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.)**

Τομάτες: Για Ετήσια αργασιακή και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού πριν από την μεταρύτευση της τομάτας.

Πατάτα: Για Ετήσια αργασιακή και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού προφυλακτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια.

Καννές: Για Ετήσια αργασιακή και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια* με 100-130 κ.εκ. ακ./στρ. σε 30-60 λίτρα φεκασιτικού υγρού πριν από την μεταρύτευση του καλαμπού.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1

Παρατηρήσεις:

** Στο βαμβάκι, προαιρετικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε μη αρδευόμενη (ξηρά εδάφη) το BASAR συνιστάται να συνδυάζεται με COTORAN 90 WG.

1. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη. 2. Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταμορφωμένες. 3. Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

* Καταπολεμώμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: *Echinochloa crus-galli* – ECHCG (μουχρίτσος), *Digitaria* sp. – DIGSS (σιματόχορτο), *Setaria* spp. – SETSS (σετάρια), *Amaranthus* spp. – AMASS (βίλητα), *Solanum nigrum* – SOLNI (αγριοντάσιμα), *Portulaca oleracea* – POROL (γλυστόριδο), *Lolium* spp. – LOLSS (ήρα), *Capsella bursa-pastoris* – CAPBP (καφέλλα), *Maticaria* spp. – MATSS (χαμομήλι), *Fumaria* spp. – FUMSS (καπνόχορτο).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: *Chenopodium album* – CHEAL (λουβουδάκι), *Polygonum persicaria* – POLPE (αγριοπιπέρι), *Cyperus esculentus* – CYPEE (κίτρινη κύπερη), *Stellaria media* – STEME (στελλάριος).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλυνθεί: Αν δεν βρεθεί σε μία εμβόδι από την εφαρμογή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή βοήθη. Η εφαρμογή του BASAR δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκλυση της δραστικής ουσίας και των μεταβολών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση) αλλά και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας. **Διαχείριση διασποράς φεκασιτικών σταγονιδίων (γεωτονικές καλλιέργειες και υδατικές επιφανείες):** Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του φεκασιτικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από: - 5 μέτρα από υδατικές επιφανείες, -10 μέτρα από γεωτονικές καλλιέργειες ή φυτά για την καλλιέργεια του αραβόσιτου. -5 μέτρα από γεωτονικές καλλιέργειες ή φυτά για τις λοιπές καλλιέργειες.

Χρονικά διαστήματα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στον ίδιο αγρό, να μην επαναληφθεί η φύτευση/όλη καλλιέργεια εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος φεκασιμός της επιφάνειας του εδάφους, με φεκασιτήρα υψηλού όγκου και φεκασιτικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής φεκασιτικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκασιτικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Φεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ορίων υφών.

Καθαρισμός φεκασιτικού: Πλύνετε καλά το φεκασιτικό μετά τη χρήση. Στεγνώστε το σωστήριό του βυθίο με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περεκτώσεώς του. Βάλτε το φεκασιτικό σε λειτουργία. Αφού το αδραστεί επαναλάβετε την διαδικασία. Φεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαλλιεργητό έδαφος μακριά από πηγές νερού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κατά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο φεκασιτικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν πραγματοποιούνται με τρίπλυμα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εγκαθίστανται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/καταστροφή του BASAR πρέπει να γίνεται σε υφιστάμενος που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Συνδυαστικότητα: Στην πατάτα (προφυλακτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το BASAR μπορεί να συνδυαστεί με το SENCO 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προαιρετικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το BASAR μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυλακτικά στο βαμβάκι το BASAR μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Τελειότητα επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Αραβόσιτος, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Καννές, Πατάτα, Τομάτα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.

Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό:

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ** τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προσπαθήστε τον από υποθερμία. Χρησιμοποιήστε επανελιγμένους ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χρησιμοποιείτε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΕΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:** Πλύνετε με άφθονο σαπουνάκι και νερό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Στεγνώστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν δεν υπάρχει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποφεύγετε να αναπνεύσετε συγκεντρωμένα σταγονίδια/εκνεφρώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιερίτ συμψα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επικινδυνά υδάτα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τον αραβόσιτο και 5 μέτρων για άλλες καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.

AP. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΑΗΣ.: βλέπε επί της συσκευασίας