

Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μείγματα αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Επεξευασμένη (Πορτοκαλά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιφ-φρούτ, Νεράτζι): i) Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ακκάδα, Μύγα Μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Μηλοκάδη (Μηλιά, Αχλαδιά):** i) Καρποκάκη Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς με 30-50* κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέστες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 2 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, Βερκοκά, Δαμασκόγινα, Κερασιά): i) Φυλλοδέστες, Ανάσκη με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέγιο με 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα Μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρποκάκη Δαμασκόγινας με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Αμύγδαλ**:** i) Ευδεμιάς με 50 κ.εκ. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.εκ. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοχλιοίδα με 50-70 κ.εκ. σκευ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκη με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Φράουλα (Υψηλόφω και Θερμοκηπίου):** Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Ελιά:** i) Δάκος με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαίων στις παγίδες, ii) Ακκάδα με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή την εμφάνιση των προσβολών, iii) Βαμβακάδα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή την εμφάνιση των προσβολών, iv) Πυρηνόκαρπος με 30-70 κ.εκ. (ανθός) ή 50 κ.εκ. (καρπός) σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή στην έναρξη της ανθήσεως (ανάθρα γενιά) και αμέσως μετά την καρποδέση (καρποθήρα γενιά) μεταξύ ωοδεσίων και εκκοκκώσεων των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαίων στις φεραμονικές παγίδες. **Τομάτα, Μελτζάνα:** Υ+Θ: i) Πράσινο ακουλήκη, Σπιντόπτερρα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα ii) Βρωμιάκη με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα iii) 18-42 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα ii) Κορτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες (Υ) και 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) με την εμφάνιση των προσβολών. **Αγγούρι, Αγγουράκι (Υ+Θ):** i) Πράσινο ακουλήκη, Σπιντόπτερρα, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κορτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Λάχανο (εκτός από Κινέζικο), Κουνουπίδι:** i) Πιερίδα, Μαϊμέστρα, Πλούζα, Πράσινο ακουλήκη, Σπιντόπτερρα, Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Πλουτέλλα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 2 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Μαρούλι (Υ):** i) Πράσινο ακουλήκη, Σπιντόπτερρα, Άλτης, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Όσπρια (Φασόλια):** Πράσινο ακουλήκη, Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 2 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Μπιζέλια Φρέσκα (αροκάκι):** i) Αφίδα των κουνιών, Θρίπες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουνιών, Κάμψια των μπιζελιών, Θρίπες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 2 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Πατάτα:** i) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σπιντόπτερρα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Βαμβάκι:** i) Ρόδινο ακουλήκη, Πράσινο ακουλήκη με 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αλευρώδης, Τζιτζικάκη με 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σπιντόπτερρα, Αφίδα, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 2 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Ζαχαροτεύλα:** i) Αφίδες, Μύγα των τευτλών, Άλτης, Σπιντόπτερρα, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Καοσίδα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Αρβόσπασ***:** i) Πυραλίδα, Σαζάκια, Πράσινο ακουλήκη, Σπιντόπτερρα, Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. ii) Διαβρόντα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών. **Σπύρι:** Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Καλλισποσάκι (Υ+Θ):** i) Αφίδες, Θρίπες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέστες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17-35 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, 3 εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοκάδη η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/ή πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο σκευάσματος υγρού (100 l/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.
** Δεν επιτρέπεται η συγκατάληψη αμυγδαλίων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
*** Η εφαρμογή του POLUX στο καλαμίσιο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτόξινων, ως αποτέλεσμα της επιτυγχάνει αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia spp. και Sesamia spp.

Εντομοκτόνο



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υγρό και αιμολιγνέλα.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- «Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1lt



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Κατόχος της άδειας: Galenika-Fitofarmacija d.o.o.
Galenika-Fitofarmacija d.o.o. - Trzaska cesta 515
T.K. 1351 - Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία
Τηλ.: +386 1 360 20 22 - Fax: +386 1 360 20 53
e-mail: galenikafitofarmacija@gmail.com
Παρασκευαστής σκευάσματος: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.
Batajnici drum bb - 11080 Belgrade Zemun - Σερβία

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτα: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ έκθεσης ή αδυσθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Θυλάξτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το φεκατοκτικό υγρό. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα αναπτύσσεται κρέμα βλατίδας. Είτε η σπάνι ναόσηση. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακί επιθήσεις, αρραβώστε τους, αρραβώστε ένα ειδικό. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πάθοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε να να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ΤΙΤΡΟ εάν αισθανθείτε αδυσθεσία. **Πληροφορίες για το γιατρό:** **Θεραπευτικά μέτρα:** Επείσοπος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναορθικών σταγόνων π.χ. 1% Amelocaine Hydrochloride. Χρησιμοποιήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Χρησιμοποιήστε διαζεπαμ για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβια, όσο χρειάζεται, ώστε να αποκαταστήσει πλήρως η ψυχία για παιδιά 2,5 mg ενδοφλέβια, Αντενδείξεις: απροπία και παράγωγα αδρεναλίνης. **ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 2107793777

Δηλώσεις προνομιούχων:
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσεται μακριά από τροφή, πόσιμα και ζωοτροφές. • Μακριά από θερμότητα/απώθησης/φλόγες/θερμής επιφάνειας. Μην καπνίζετε. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε εκκυματώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδυμασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Διάδεση των περιεχομένων/περιέκτη σιμωνα με την εθνική νομοθεσία. • «Οι εργαζόμενοι να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το φεκατοκτικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια». • «Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή». • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή το σκευαστικό του. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυμέλες τους για μια μέρα εξορροαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυμέλης ή να απομακρυνθούν οι κυμέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων. «Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αέκαστη ζωή προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δεινρόδους καλλιέργειες και την ελιά 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αέκαστη ζωή προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη. • Επιδίνουν για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιαστές μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας. Ωρίωνων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζώα πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκατάληξη: Βαμβάκι, Ζαχαροτεύλα, Πορτοκαλά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιφ-φρούτ, Νεράτζι, Αραβόσπας, Σπύρι: 30 ημέρες. Αμύγδα, Ελιά, Πατάτα, Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδάκινο, Βερκοκά, Δαμασκόγινα, Κερασιά, Φασόλια, Μελτζάνα: 7 ημέρες. Τομάτα, Μελτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι: 3 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία του σκευάσματος του σε δροσερό χώρο καλά αερισμένο μακριά από ήλιο και υγρασία. Διατηρήστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.

Τρόπος εφαρμογής: Φεκατοκτικό φυλλοκτόνο. **Τρόπος παρασκευής φεκατοκτικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του φεκατοκτικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος γίνεται σε υψομικροί που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά σκευάσματος ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο με κατάλληλο εξοπλισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκατοκτικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστράφουν προηγούμενος με τριπλή ή σήλωση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδοτίζονται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές αναδείξεις γεωργικής, αυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** 1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειωθούν οι αριθμοί των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημίας. 3. Το σκευάσμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξορροαλίζονται καλά και ομοιόμορφα τις φυλλικές επιφάνειες με το φεκατοκτικό υγρό. 4. Να αποφευχθούν οι διαδοχές εφαρμογών του προϊόντος. Το σκευάσμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 5. Να διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι των πληθυσμών των εντόμων-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενογράφου πλάκας, ειδικά στους μικροκλίμα, έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **Συγκρίσεις φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό έρραον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ.ΗΜ ΔΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FARMA-CHEM SA

ΒΙΛΠΕ. ΣΙΔΩΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

