



Klasifikimi i rezikut

Etiketuar sipas rregullores (EC) No 1272/2008

Produkti është klasifikuar dhe etiketuar sipas rregullores së CLP.

Deklaratë e rezikut

H315: Shkakton acarim të lëkurës

H317: Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.

H319: Shkakton acarim serioz të syve.

H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.

H410: Shumë toksik për gjallesat ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme.

Deklarata parandaluese të përgjithshme

P101: Nëse kërkohet këshilla mjeksore atëherë tregoni etiketën e produktit mjekut.

P102: Mbajeni larg nga fëmijët.

Deklarata parandaluese

P261: Shmangni thithjen e produktit me frymëmarrje.

P270: Mos hani mos pini lengje dhe duhan gjatë përdorimit të këtij produkti.

P280: Veshni doreza dhe veshje mbrojtëse për trupin.

P302 + P352: Në rast kontakti me lëkurën (flokët), lahuni menjëherë me ujë të bollshëm dhe sapun.

P305 + P351 + P338 Në rast kontakti me sytë lajeni meujë të bollshëm për disa minuta, hiqni lentet e kontaktit nëse është e nevojshme dhe e lehti për tu bërë. Vazhdon shplarjen.

P362+P364: Hiqni rrabot e kontaminuara pas përfundimit të punës dhe lajeni ato para ripërdorimit

P501: Shkaterrimi i permbytjes /amabalazhit ne perputhje me rregullat në fuqi.

Deklaratë e rezikut shtesë

EUH401: Të evitojen reziqjet e shendetit të njeriut dhe ambientit, në përpuethshmëri me instruksiون për përdorim.

Udhëzimë të mëtejshme në lidhje me reziqjet dhe masat e sigurisë: Kujdes, produkt për mbrojtjen e bimëve!

TALISMAN®

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



HERBIZID

Lënda vepruese: – 40 g/L Nicosulfuron

Formulimi: — Vaj dispersiv (OD)

TALISMAN është një herbicid selektiv sistemik, i pas mbjelljes (mbirjes). Përdoret për kontrollin e barërave të këqija një dje shumëveçare në misër. Ky herbicid thithet nga bima nëpërmjet gjethes dhe sistemit rrënjosrë dhe lëviz në indet e rritjes të bimës në drejtim akropetal dhe bazipetal (nga ksilema në floemë). Pengon sintezën e Acetolaktazen (ALS), bllokon ndarjen qelizore dhe rritjen e barit të keq.

Nr dhe data e regjistrimit: 675, date 6.02.2017.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: 1 L.

Data e prodhimit: Printuar nga makineria ne ambalazh.....;

.....;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseve të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuase: Printuar nga makineria ne ambalazh.....;

Tipi i amballazhit bazë: shishe plastike PET ose COEX ose HDPE.

Emri dhe adresa e Aplikimit: Galenika-Fitofarmacija d.o.o. Adresa: Trzaska cesta 515 I SI-1351 Brezovica pri Ljubljani Slovenia.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: Galenika-Fitofarmacija a.d. Adresa: Batajnicksi drum bb Belgrade Serbia.

Distributori per Shqiperinë; Agrohelp-SA.sh.p.k, Autostrad Tirane –Durrës km22 Durrës Shqipëri



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Ndikimi në ekosistem:

Shumë toksik për gjallesat ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme. Mos ndotni ujrat dhe burimet ujore që rrjedhin në lumenj, përenj e rezervuarë uji.

Ruajtja dhe magazinimi:

Duhet të ruhen dhe të mbahen në paketim original me etiketa origjinal, në një vend të thatë dhe të freskët, në një dhomë të veçantë. Temperatura e ruajtjes nuk duhet të jetë më pak se 5°C ose më e lartë se 30°C. Talisman nuk duhet të bjerë në një enë ose në enët për ushqim apo pijë.

Barërat e këqija që kontrollon:

Emri i barit të keq	Emri Latin
Barërat e këqija gjethegjëra	
Nena	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Trasta e çobanit	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Laboti i egër	<i>Chenopodium polyspermum</i>
Tatulla	<i>Datura stramonium</i>
Laboti	<i>Chenopodium album</i>
Bamja e egër (Bamja e qeve)	<i>Hibiscus trionum</i>
Hithëbuta e pupurtë	<i>Lamium purpureum</i>
Nejca pjeshkore	<i>Persicaria maculosa</i>
Nejca	<i>Fallopia convolvulus</i>
Vjollca e arave	<i>Viola arvensis</i>
Gjethë delli	<i>Plantago major</i>
Veronika persiane	<i>Veronica persica</i>
Barërat e këqija gjethengushta	
Muhari	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Kostreva	<i>Setaria viridis</i>
Meli i përgjakur	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Talla	<i>Sorghum halepense</i>

Përdorimi:

Kultura	Doza	Koha e Aplikimit	Karenca PHI
Misër	1 – 1.5 l/ha Në 200-400lit ujë	Nga faza dy deri gjashtë gjethje	Nuk aplikohet

