

TALISMAN

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: — Nicosulfuron 4% (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: — 96% (β/β)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70212/06.06.2017

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξυγαλακτικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ



GALENIKA - FITOFARMACIJA

● Προξενεί ερεθισμό του δέρματος. ● Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. ● Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ● Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:

Galenika-Fitofarmacija d.o.o
Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής σκευάσματος:

Galenika Fitofarmacija a.d., Belgrade, Σερβία

Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις σκευάσματος-

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μεγ. αριθμός εφαρμ/ καλ./κη περίοδο:

Αραβόσιτος: Για ζιζάνια με 0,75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max) ή 112,5-150 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος (BBCH 12-18).

Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus sp.*), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αιματόχορτο (*Digitaria spp.*), Σετάρια (*Setaria spp.**), Βέλιουρας (*Sorghum halepense**).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριοτοματί (*Solanum nigrum**), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Πολύγυμο (*Polygonum convolvulus*), Πάνικο (*Panicum miliaceum**).

* Για την καταπολέμηση των εν λόγω ζιζανίων να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το TALISMAN, στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος. ii) **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Για σπορά χειμερινού σπαραίου πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του TALISMAN και αφού προηγηθεί βαθιά άροση. iii) **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Επιτρέπεται η είσοδος εργατών στον αγρό αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων για βόσκηση για 50 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών: Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα μετά τον ψεκασμό για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3%. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλωρίνη οικιακής χρήσης.

Να ακολουθηθούν τα εξής στάδια καθαρισμού: 1) Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο. 2) Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος για 10 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως το βυτίο ξανά. 3) Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο.

Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο: ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ● Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. ● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

● Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. ● Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: —.

Φυτοτοξικότητα: Κατά την 1^η-2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

-Να μη χρησιμοποιείται στο 'γλυκό καλαμπόκι' και σε καλλιέργειες σε αραβόσιτο που προορίζεται για σπορά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αραβόσιτος: -.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 °C.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες



FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA

ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Γ' ΖΩΝΗ
ΤΗΛ.: 2310 569 630 έως 33 - FAX: 2310 797 047
Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr



Ζιζανιοκτόνο



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο