



HERBICID

BASAR® PLUS

Aktivna materija:

» S-metolahlor(312,5 g/l preparata) + terbutilazin (187,5 g/l preparata)

Zemljišni tretman herbicidima antirezistetna strategija



Prednosti primene zemljišnog tretmana:

- ✓ Nicanje useva **bez ili uz redukovano** prisustvo korova
- ✓ Manje su mogućnosti prerastanja korova za suzbijanje u post-em (folijarnom) tretmanu
- ✓ **Smanjivanje** potencijala prisustva korovskih vrsta - „čišćenje“ njive
- ✓ Dobra strategija u borbi protiv pojave **rezistentnosti** korova
- ✓ Odlično **delovanje** na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove

Primena:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Kukuruz	4-4,5 l/ha	tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka
Suncokret	3-3,5 l/ha	tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka

Preporučujemo:

- ➡ Za prevenciju smanjenja osetljivosti određenih korovskih vrsta na herbicide, koji se koriste za folijarno suzbijanje korova u kukuruzu, preporučujemo tretman posle setve, a pre nicanja kao obaveznu mjeru.