



INSEKTICID

INSEKTICID

FURIOSO**Aktivna supstanca:** spirotetramat 100 g/l preparata**Savremeno rešenje
u zaštiti kruške i jabuke!****Prednosti primene:**

- ✓ Odlikuje ga jedinstvena dvosmerna sistemičnost
- ✓ Nakon aplikacije kreće se i kroz ksilem i kroz floem transportujući se u sve delove biljke
- ✓ Veoma dugo perzistira u voćarskim zasadima (2-3 nedelje)
- ✓ Pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju kruškine buve u zasadu kruške, kao i u suzbijanju krvave vaši u zasadu jabuke
- ✓ Posebnu efikasnost pokazuje kada se primeni za suzbijanje juvenilnih stadijuma
- ✓ Kod tretiranih odraslih ženki dolazi do značajnog smanjivanja plodnosti i broja položenih jaja, što za posledicu ima smanjivanje populacije insekata

Spektar delovanja i primena

GAJENA BILJKA	ŠTETNA VRSTA	KONCENTRACIJA PRIMENE	VРЕME PRIMENE
KRUŠKA	obična kruškina buva (<i>Psylla pyri</i>)	0,15%	na početku piljenja larvi
JABUKA*	krvava vaš (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	0,15 %	pri pojavi prvih pokretnih formi, odnosno na početku migracije sa drveta na zelene delove biljke

*U toku je proces registracije

Preporučujemo:

- ➡ Najveću efikasnost pokazuje kada se primeni od fenofaze precvetavanja u zasadima kruške, na početku piljenja larvi, tačnije u fazama „bela jaja“, „žuta jaja“ i „prve ispiljene larve“
- ➡ U zasadima jabuke pokazuje veoma efikasno delovanje ukoliko se primeni po pojavi prvih pokretnih formi krvave vaši, odnosno na početku njihove migracije sa drvenastih na zelene delove biljaka