




INSEKTICID

 **HARPUN**[®]


Aktivna supstanca: piriproksifen (100 g/l preparata)

**Dokazan i potvrđen
kvalitet i u EU**



Proizvod HARPUN je ispitivan u različitim klimatskim uslovima širom EU.

- ✓ Urađeno je više od **80 ogleđa** biološke efikasnosti u EU
- ✓ Visoka efikasnost proizvoda HARPUN je **podjednako dobra ili bolja** od registrovanih referentnih proizvoda u EU
- ✓ Ispitivanja su izvršena od strane **renomiranih** GEP ustanova
- ✓ Ispitivanja su vršena na sledećim štetnim insektima:
 - » jabukin smotavac (*Cydia pomonella*),
 - » kruškina buva (*Psylla pyri*),
 - » leptiraste vaši (*Trialeurodes vaporarium*, *Bemisia tabaci*),
 - » štitaste vaši (*Pseudolacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus pentagona*)
- ✓ Proizvod je na raspolaganju farmerima u **22 države Evrope**
- ✓ **Kvalitet proizvoda prepoznat** od strane vodećih distributera u Evropskoj uniji
- ✓ Visoka selektivnost prema **korisnim** insektima
- ✓ Formulacija **bez fenola**, upotreba specijalnih rastavarača



Spektar delovanja i primena

Gajena biljka	Štetna vrsta	Koncentracija primene	Vreme primene
Jabuka	jabukin smotavac (<i>Cydia pomonella</i>)	0,075% - 0,1%	na početku polaganja jaja
Kruška	kruškina buva (<i>Psylla pyri</i>)	0,15%	na početku piljenja larvi tokom vegetacije
Breskva	breskvin smotavac (<i>Cydia molesta</i>)	0,1%	pre ubušivanja prvih gusenica u plodove
Paradajz (u zaštićenom prostoru)	bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,05% - 0,075 %	u vreme pojave imaga
Kajsija	jabukin smotavac, breskvin smotavac (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia molesta</i>)	0,04-0,05 %	pre ubušivanja prvih gusenica u plodove
Borovnica	biljne vaši (Aphididae)	0,04-0,05 %	na početku formiranja prvih kolonija
Plavi patlidžan	bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,05-0,075 %	u vreme pojave prvih jedinki
Kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica i slačica	pepeljasta vaš kupusa (<i>Brevicoryne brassicae</i>) pamukova sovica (<i>Helicoverpa armigera</i>)	0,05-0,075 %	u vreme pojave prvih jedinki u vreme pojave prvih gusenica
Boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak	pamukova sovica (<i>Helicoverpa armigera</i>)	0,05-0,075 %	u vreme pojave prvih gusenica
Salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič, endivija i motovilac	pamukova sovica (<i>Helicoverpa armigera</i>)	0,05-0,075 %	u vreme pojave prvih gusenica

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Jabuka, kruška, breskva	28
Kajsija, salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič, endivija i motovilac	14
Kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica, slačica, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak, borovnica	7
Paradajz, plavi patlidžan	3