



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове алергијске реакције на кожи. Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Не удисати прашину/ дим/ гас/ маглу/ пару/ спреј. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде. Потражити медицински савет/ посматрање, ако се не осећате добро. Скинути контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе. Одргавање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *S-metolahlor, terbutilazin*
ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: **SP 1** Срећити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средстава за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКА: **SPo2** После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

НАПОМЕНЕ: Не сме се користити на изразито лаким, песковитим земљиштима (< 1% хумуса), крашким пољима и земљиштима чија је рН < 5,5. Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва. У случају преоравања или превременог скидања на третираним површинама могу се сејати кукуруз и сунцокрет. После 5 месеци могу се сејати пшеница (уз дубоко орање), а у јесен луцерка, детелина и уљана репица.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Потребну количину средства сипати у резервоар прскалице, претходно до половине напуњен водом, затим допунити резервоар водом и добро промешати. Примењује се стандардним уређајима за третирање са земље.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Може да се меша са средствима на бази meztotipia. Пре мешања са другим средствима треба проверити њихову компатибилност.

BASAR® PLUS

Хербицид у облику концентроване суспензије - SC



HERBICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: — S-METOLAHLOR

Хемијски назив: — *смеша изомера 2-hlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(1 S)-2-metoksi-1-metiletil]]acetamida (80-100%) и 2-hlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(1 R)-2-metoksi-1-metiletil]]acetamida (20-0%)*

Садржај: — 312,5 ± 15,63 g/l

Техничка чистоћа: — мин. 96 %

CAS број: — 87392-12-9 (S-isomer), 178961-20-1 (R-isomer)

Активна супстанца:

Генерички назив: — TERBUTILAZIN

Хемијски назив: — *N2-terc-butil-6-hloro-N4-etil-1,3,5-triazin-2,4-diamin*

Садржај: — 187,5 ± 11,25 g/l

Техничка чистоћа: — мин. 95 %

CAS број: — 5915-41-3

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.
Београд, Батајнички друм бб
тел. 011/ 3072-372

ПРИМЕНА: BASAR PLUS је селективни хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова у усеву кукуруза и сунцокрета.

РОК УПОТРЕБЕ: 3 године, ако се правилно складишти.
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.



GALENICA - FITOFARMACIJA

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!
ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

ПРИМЕНА: BASAR PLUS је селективни хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова у усеву кукуруза и сунцокрета. Примењује се после сетве, а пре ницања усева и коровских биљака, у количини од:

- 4 – 4,5 l/ha (40 до 45 ml на 100 m²) у усеву кукуруза

- 3 – 3,5 l/ha (30 до 35 ml на 100 m²) у усеву сунцокрета

Максимална доза тербутилазина не сме прећи 850 g/ha.

Утрошак воде: 200 – 400 l/ha (2-4 l на 100 m²).

Максималан број третирања: једном, сваке треће године на истој површини.

СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА:

Добро сузбија: штир блџтави (*Amaranthus blitoides*), штир обични (*Amaranthus retroflexus*), вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*), тарчужак обични (*Capsella bursa-pastoris*), пепељуга обична (*Chenopodium album*), пепељуга срцолисна (*Chenopodium hybridum*), мухар велики (*Echinochloa crus-galli*), татула обична (*Datura stramonium*), лубеничарка њивска (*Hibiscus trionum*), дворник птичији (*Polygonum aviculare*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*), мухар сиви (*Setaria glauca*), мухар зелени (*Setaria viridis*), помоћница обична (*Solanum nigrum*), сирак дивљи из семена (*Sorghum halepense*), чистац једногодишњи (*Stachys annua*).

Задовољавајуће сузбија: липица теофрастова (*Abutilon theophrasti*).

Слабо сузбија: паламида њивска (*Cirsium arvense*), попонац њивски (*Convolvulus arvensis*), реника обична (*Lepidium draba*), сирак дивљи из ризома (*Sorghum halepense*).

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-411/2017-11 од 15.03.2018. године са свим важећим изменама и допунама.

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: GOLIC TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb
tel: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske br. 12.03.3-330-1262/19 od 27.05.2019. godine.



НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

А) На биљке (фитотоксичност): Фитотоксичан је за гајене усеве ако се примени на врло слабо хумозним земљиштима (< 1% хумуса) и земљиштима чија је рН вредност <5,5.

Б) На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне спречити контаминацију вода (водотокова, бунара, језера, изворишта вода), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

В) На организме у води (токсичност): Веома је токсичан за организме у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта водоснабдевања) и канализациону мрежу.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве):

Обезбеђена временом примене – кукуруз, сунцокрет

РАДНА КАРЕНЦА (време када није допуштен рад људима у пољу и заштићеном простору после третирања): До сушења депозита.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ: У случају тровања могу се јавити следећи симптоми: мука, гађење, слабост и малаксалост, главобоља, а некада и повраћање, болови у стомаку, проливи, а у тежим случајевима тровања и фасцикулације мишића, убрзано дисање, атаксија и конвулзије. Такође, у тежим случајевима тровања може се јавити оштећење плућа, јетре и бубрега. Након контакта са кожом и слузницама може се јавити локално црвенило и свраб, а у дужем контакту појава контактнoг дерматитиса и испољавања промена које подсећају на копривњачу. Након инхалационе изложености може доћи до иритације дисајних путева са сувим, надражајним кашљем и отежаним дисањем.

Прва помоћ и лечење: У случају инхалације, затрованог извести на свеж ваздух и обратити се лекару. У случају ингестије, уколико је особа свесна и сарађује, дати да попије 2-3 чаше воде и обратити се лекару. У медицинској установи урадити лаважу желуца уз заштиту дисајних путева, ако постоји поремећај вести. У тежим случајевима тровања дати инфузиони раствор, антиколвузиве и хепатопротективе. У случају бубрежне инсуфицијенције примењује се хемодијализа. Уколико дође до контактa са кожом контаминирану површину добро опрати водом и сапуном, а ако дође до иритације коже или осипа обратити се лекару. Уколико дође до контакта са очима

извршити испирање са доста воде у трајању од 15 минута (пре тога уклонити контактна сочива, ако постоје). По потреби, обратити се за помоћ лекару (специјалисти за очи).

Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна.

У случају потребе за савет (детаљнија упутства) обратити се Националном центру за контролу тровања ВМА – Црнотравска 17, тел: 011/ 3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: Прибавити посебна упутства пре употребе, а пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и безбедности. При одласку у медицинску установу понети етикету производа или амбалажу. При раду са препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Радници могу бити изложени током производње и примене средства као и током поновног уласка у третирана подручја, што се може спречити коришћењем одговарајуће личне заштитне опреме. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Контаминирано радно одело после примене скинути, не носити ван радног места и пре поновне употребе опрати.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5–40°C), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћаја деце, нестручних особа и животиња.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрешити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;

BASAR® PLUS