



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове алергијске реакције на кожи. Може да има штетно дејство на одојчад. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Орати детаљно руке и лице након руковања. Избежавати контакт за време трудноће и током дојења. Не јести, не пити и не пушити током приликом руковања овим производом. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет/ посматрање. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *trifloksistrobin, 2,2,2'-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-tril)trietanol*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

Belatrix®

Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC



FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA 11 FUNGICID

Активна супстанца:

Генерички назив: TRIFLOKSISTROBIN

Хемијски назив (IUPAC): (metil (E)-metoksiimino-((E)-a-[1-(a,a-trifluoro-m-tolil)etilidenaminooksil]-o-tolil)acetat

Садржај: 500 ± 25 g/l

Техничка чистоћа: мин. 975 g/kg

CAS број: 141517-21-7

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд, Батајнички друм бб,

тел.: 011/ 3072-372

ПРИМЕНА: BELATRIX је локалсистемични фунгицид са протективним и куративним деловањем, намењен за сузбијање проузроковача пепелнице и складишних болести у засаду јабуке и пепелнице (*Sphaerotheca pannosa*) у засаду брескве.

РОК УПОТРЕБЕ: 4 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕ-

ГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО

ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: BELATRIX је локалсистемични фунгицид са протективним и куративним деловањем, намењен за сузбијање:

- проузроковача пепелнице (*Podosphaera leucotricha*) у засаду јабуке, третирањем у току вегетације превентивно, пре појаве симптома обољења (фаза 11/54-81 ВВСН скале) и

- проузроковача складишних болести (*Monilinia fructigena, Penicillium spp.*) третирањем у фази технолошке зрелости плодова (фаза 81-87 ВВСН скале), а најкасније 14 дана пред бербу.

- проузроковача пепелнице (*Sphaerotheca pannosa*) у засаду брескве, третирањем током вегетације од фенофаза прецветавања (ВВСН 69), а најкасније 7 дана пред бербу.

Количина примене је 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml на 100 m²).

Утрошак воде: 600-1000 l/ha (6-10 l на 100 m²).

Максималан број третирања на истој површини у току године:

- у засаду јабуке укупно 4 пута - два пута у току вегетације и два пута у току складиштења

- у засаду брескве три пута у току вегетације

Размак између третирања - 10-14 дана

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолијарно, фино прскање или орошавањем.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема уливањем у танком млазу, одмерене количине препарата у потребну количину воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 7 дана за брескву, 14 дана за јабуку.

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): 1 дан

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и непућеним особама.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-00010/2022-11 од 12.12.2022. године са свим важећим изменама и допунама.

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:

GOLIC TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb.

Tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske br: 12.03.3-330-2037/23 od 28.07.2023. godine.

НАПОМЕНА: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Није фитотоксичан, ако се примењује према упутству за употребу.

МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Пре мешања са другим препаратима проверити њихову физичку компатибилност.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 30 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Веома токсично за живи свет у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања: Симптоми укључују иритацију очију са сузењем и црвенилом коњуктива, иритацију горњих респираторних путева са сувим надражајним кашљем, општу слабост, малаксалост, вртоглавицу, црвенило и свраб коже, стезање у грудима. Након ингестије доводи до мучнине, повраћање, опште слабости и малаксалости.

Прва помоћ и лечење: Након удисања изнети експонирану особу на чист ваздух. Након контакта са кожом скинути контаминирану одећу, кожу обилно испрати водом и сапуном. Контаминирану одећу пре поновне употребе треба опрати. Уколико дође до контакта са очима, обилно испрати очи водом у трајању од 15 минута. Пре тога уклонити контактна сочива, уколико постоје. Након ингестије, уколико је особа свесна и сарађује, испрати уста и дати да попије 2-3

чаше воде. Одмах се обратити лекару. Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна. У случају тровања, за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17. тел. 011/3608-440.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуирати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утршити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробušити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

Belatrix®