

GHS07



ПАЖЊА

под кључем. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средстава за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 Не прилазити близу биљака или третираних површина док се депозит потпуно не осуши.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ: Cosavet 80-DF спада у групу БЛАГИ ИРИТАНСИ. У ову групу спадају материје које делују иритативно на кожу и слузнице очију, респираторног и дигестивног тракта. Промене се испољавају појавом црвенила или алергијским реакцијама.

Симптоми и знаци: Свраб, пецкање по кожи, у гуши, очима и носу, што прати и сув надражајни кашаљ. У случају ингестије, јављају се болови у трбуху, повраћање и проливи. На местима иритације кожа је црвена и лако отечена, а у случају испољавања алергије карактеристичне су промене које подсећају на копривњачу.

Прва помоћ и лечење: прекинути даљи унос отрова у организам, испрати кожу и слузнице ока обичном чистом водом. Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминике по потреби. У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Црнотравска 17, тел: 011 662-381 или 3608-440.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћа деце, нестручних особа и животиња.

ПОСТУПАЊЕ СА ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства за заштиту биља заостао у амбалажи.

Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са испражњеном амбалажом поступати у складу са прописима којима се уређују амбалажа и амбалажни отпад.

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини; Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбентом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирани површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирани одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Изазива иритацију коже.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА

ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћа деце. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Пре употребе прочитати информације на етикету. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ:


Испрати са доста воде. Ако дође до иритације коже. Потражити медицински савет/ посматрање. Скинути контаминирани одећу и опрати је пре поновне употребе. Складиштити



1 KG

COSAVET 80-DF®

Фунгицид у облику вододисперзибилних гранула– WG



Proizvođač:



Sulphur mills limited

H.O. : 604/605, 349 Business Point,
Andheri (E), Mumbai - 400 069. INDIA
E-mail : sml@sulphurmills.com

Zastupnik i distributer:



GALENKA - FITOFARMACIJA

Beograd-Zemun, Batajnički drum bb
Srbija, tel: 011/3072 372
www.fitofarmacija.rs

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

- Генерички назив: Sumpro
- Хемијски назив: Sumpro
- Садржај: 800 ± 25 g/kg
- Техничка чистоћа: мин. 99 %
- CAS број: 7704-34-9

ПРИМЕНА:

COSAVET 80-DF је фунгицид са несистемичним деловањем који се користи за сузбијање:

- проузроковача пепелнице (*Podospaera leucotricha*) у засаду јабуке у количини од 0,3% (3 kg/ha) током вегетације, и то превентивно.

- проузроковача пепелнице (*Uncinula necator*) у засаду винове лозе у количини примене 5-7 kg/ha (50-70 g на 100 m²), током вегетације (BBCH скала 11/12-79), превентивно. Утрошак воде је 600-1000 l /ha (6-10 l на 100 m²).

Максималан број третирања на истој површини у току године је четири пута у засаду јабуке и три пута у засаду винове лозе.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ:

Средство се припрема тако што се одмерена количина препарата измеша са мало воде да се добије густа каша, која се сила у резервоар прскалице и допуни потребном количином воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање са земље.

НАПОМЕНЕ:

Препарат није довољно ефикасан за примену по појави обољења и при јаком инфекционом потенцијалу патогена. Третирање се изводи на температурама од 18-28°C.

Третирањем на температурама нижим од 16°C препарат делује слабије, због мање испарљивости сумпора. Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ

БИЉА: Не сме се мешати са средствима за заштиту биља јако алкалне и јако киселе реакције.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На биљке (фитотоксичност): Може бити фитотоксичан:

- ако се примени на температурама >28°C.
- на неке сорте јабуке (Berlepsch, Ontario, Cox orange)

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотокова, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве): 14 дана за јабуку и 28 дана за винову лозу.

РАДНА КАРЕНЦА (време када није допуштен рад људима у пољу и заштићеном простору после третирања): 24 сата.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-01736/2018-11 од 01.01.2020. године.

