

ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Сумња се да може штетно да утиче на плод. Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет/ посматрање. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: flumioksazin.

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Садржи 2,2',2''-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol. Може да изазове алергијску реакцију.

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: Sро 2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°С), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домашаја деце, нестручних особа и животиња.



Factor®

Хербицид у облику концентроване суспензије – SC

500ml

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца: — FLUMIOKSAZIN
Хемијски назив: — N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksamid
Садржај: — 500 ± 25 g/l
Техничка чистота: — min. 96%
CAS број: — 103361-09-7

ПРИМЕНА: ФАСТОР је селективни, системични хербицид који се користи за сузбијање корова у усеву соје.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти. Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти. Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА

GRUPA 14 (E) HERBICID

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ. ПРОМУЊКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

ПРИМЕНА: ФАСТОР је селективни, системични хербицид који се користи за сузбијање корова у усеву: - соје третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева и корова у количини од 0,12 l/ha (1,2 ml на 100 m²) Утрошак воде: 200 – 400 l/ha (2-4 l на 100 m²).

Максималан број третирања на истој површини у току године: један пут у току године.

СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА:
Добро сузбија: липица теофрастова (*Abutilon theophrasti*), штир обични (*Amaranthus retroflexus*), пепељуга обична (*Chenopodium album*), пепељуга срцелисна (*Chenopodium hybridum*), татун обична (*Datura stramonium*), горущица пољска (*Sinapis arvensis*), помоћница обична (*Solanum nigrum*), чистац једногодишњи (*Stachys annua*), боца обична (*Xanthium strumarium*).
Задовољавајуће сузбија: амброзија пеленаста (*Ambrosia artemisiifolia*), пубеничарка њивска (*Hibiscus trionum*), велики мухар (*Echinochloa crus-galli*).
Слабо сузбија: поповац њивски (*Convolvulus arvensis*), сирак дивљи из ризома (*Sorghum halepense*).

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 000374892 2023 14842 003 000 321 009 од 28.11.2024. године са свим важећим измена и допунама.

ПРОИЗВОДИ:
ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.
Београд, Батајнички друм 66
тел. 011/ 3072-372



НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фолитарно, стандардним уређајима за третирање са земље.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Потребну количину препарата сипати у резервоар прскалице, претходно до половине напуњен водом, затим допунити резервоар водом и добро промешати. Примењује се стандардним уређајима за третирање са земље.

НАПОМЕНЕ: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва. На лаким земљиштима, ако се средство примени при хладном и влажном времену може доћи до појаве пролазне фитотоксичности. Четири месеца након примене може се сјетити речач, раж, грашак, кукуруз шећерац, а после 12 месеци од примене могу се сјетити лучерна, детелина, уљана репица, орас, шећерна репа, салата и повртарске биљке из фамилије тикава (*Scabritaceae*).

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Може се мешати са средствима на бази s-metolahlora, pendimetalina и klopazona. Пре мешања са другим средствима за заштиту биља проверити њихову компатибилност.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

а) На биљке (фитотоксичност): Због фитотоксичности, приликом третирања спречити заношење препарата на све суседне оастљиве усеве. При неповољним условима (приликом влажног и хладног времена) на лакшим земљиштима може доћи до пролазне фитотоксије.

б) На организме у води (токсичност): Веома токсичан по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта вода и водоснабдевања) и канализациону мрежу.

в) На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне

зоне и спречити контаминацију вода (водотокова, бунара, језера, изворишта вода), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): Обезбеђена временом примене.

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштитеном простору): 6-12 часова

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци: У контакту са којом изазива иритацију која се манифестује црвенилом, оток и сврабом коже, а при понављајућој експозицији могућа је сензибилизација са сувом оштећеном кожом склоном пуцању. У контакту са очима доводи до изражене иритације са појачаним сузењем, болом у очима и хиперемијом конјуктива. Након ингестије може се јавити мучнина, повраћање и малаксалост. Ако се удише могућа је иритација дисајних путева са надражајним кашлем и отежаним дисањем

Прва помоћ и лечење: У случају инхалације обезбедити свеж ваздух. Консултовати лекара у случају тегоба. После контакта са којом скинути евентуално контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом и сапуном. После контакта са очима обилно испрати очи водом у трајању од 15 минута, уз отворене очне капке, а након тога се обратити лекару. После ингестије уколико је особа свесна и сарађује испрати уста и дати да попије 2-3 чаше воде.

Лаважу спроводити уз консултацију токсиколога, у болничким условима, код ингестије потенцијално смртне дозе, у року од сат времена од ингестије. Уколико постоји поремећај свести, потребна је интубација због заштите дисајних путева. Након тога дати медицински угљ.

Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна.

У случају тровања, за блика упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел.: 011/3608-440 или 2662-381.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом придржавати се општех мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. Избегавати контакт са кожом посебно са слузицама. После завршетка рада, руке и лице добро опрати и иштуирати се. Контаминирано радно одело после примене скинути, а пре поновне употребе опрати. При одласку у медицинску установу понети етикету производа или амбалажу.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оcede 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промешати;
4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оcede 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробрушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав окстем. Раставити и очистити дисње, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и узорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенком (песак, пљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смеџом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

Factor®