

Fertigal

CaB Organo

Врста и тип ђубрива: Органско-неорганско азотно ђубриво
Назив ђубрива у оквиру типа: Органско-неорганско азотно течно ђубриво

Садржај хранљивих елемената:

Азот (укупни) (N) 13%/-0,9% (10,8% као NH₂-N)
Азот (органски) (N) 2,2%/-0,36%
Калцијум (као CaO) 10%/-0,9%
Бор (B) 0,028%/-0,0056%
Угљеник органски (C) 6,4%/-0,64%
C/N однос 2,9%/-0,29%

Физичке особине: раствор, жуте боје, карактеристичног мириса
запреминска маса: 1,25 g/cm³
pH вредност: 4



ПАЖЊА

Обавештење о опасности: Доводи до јаке иритације ока.

Обавештење о мерама предострожности: Чувати ван домаћаја деце. Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице. АКО

ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет / мишљење. Одлагање садржаја / амбалаже у складу са националним прописима.

Начин руковања и складиштење:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге и атмосфералија у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

Напомена: Не сме се мешати са ђубривима на бази фосфора и сумпора. Промућкати пре употребе.



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Препоручена количина, начин и време примене: Препоручује се за исхрану различитих биљних врста на различитим типовима земљишта, а нарочито на земљиштима са дефицитом калцијума.

Број третирања у току године је према потреби 2-6 пута.

Примењује се:

- **у лиснатом поврћу**, системима за фертигацију у количини од 30-40 l/ha почетком вегетације и 15 дана након прве примене

- **у усеву парадајза, краставца, лубенице и диње**, системима за фертигацију у количини 20 l/ha или фолијарно 200-300 ml/100 l воде у фази 4-6 листова. Третман треба поновити пре првог цветања.

- **у усеву паприке и патлиџана**, системима за фертигацију у количини 20 l/ha или фолијарно 200-300 ml/100 l воде у фази 4-6 листова. Третман поновити након 10-15 дана.

- **у засаду јабучастиг воћа**, од фазе прецветавања до бербе у интервалима од 7-14 дана. Златни делишес третирају фолијарно раствором 600 ml/100 l воде а друге сорте раствором 150-200 ml/100 l.

- **за третман плодова после бербе**, потапањем у раствор који садржи 2,5 l препарата/100 l воде. Плодови се потапају током 30-60 секунди, при чему треба водити рачуна да температура плодова и раствора за потапање не буде различита. Плод се након потапања мора сушити како не би дошло до оштећења pokožице током складиштења.

Рок употребе: 2 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача бр. 321-01-02367/2015-11 од 22.02.2016. године

Производи:

FARMA-CHEM S.A.,
Industrial Area of Sindos,
postal code 57022,
Thessaloniki (Greece)



Заступник и дистрибутер:

Галеника-Фитофармација а.д.

Батајнички друм бб
Београд-Земун
Тел: 011 3072 372



8