

**Начин руковања и складиштења:**

Резервоар прскалице напунити до пала водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације. При раду са препарatom придржавати се општих мера хигијенско -техничке заштите.

Производ складишти у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаџа деце и неупућених особа. Складишти на температурама од 5 до 40°C.

**Препоручена количина примене:**

Примењује се за прихрану различитих биљних врста у ратарству, повртарству и воћарству, на земљиштима дефицитарним бором, на отвореном или у заштићеном простору.

Примењује се фолијарно у следећим усевима/засадима:

- **Јабука, крушка:** 1-2 l/ha у фази кретања пупољака, на почетку цветања и у тренутку опадања лисних дршки. Примена у количини од 2 l/ha се препоручује после бербе, али пре опадања лишћа. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Трешња, шљива:** 1-2 l/ha применити у фази зимских пупољака, затим у фази цветног пупољка. Примена у количини од 2 l/ha се препоручује после бербе, али пре опадања лишћа. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Јагода (на отвореном):** Два третмана у количини од 1 l/ha, први у фази белог пупољка и други након 10-14 дана. Количина воде: 200-500 l/ha
- **Кромпир:** 1-2 l/ha недељу дана након ницања свих биљака, а у случају потребе поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Пасуљ, грашак:** 2 l/ha када је усев 10-15 cm висине. У случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Мркva:** 3 l/ha када је биљка висока 10-15 cm висине или када је лисна маса довољна за фолијарну асорпцију, а у случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Кељ, броколи, прокељ, купус, карфиол:** 3 l/ha у фази 4-6 листова, а у случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Шећерна репа, цвекла, бела репа:** 1 l/ha у фази 4 до 6 листова. У случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Уљана репница:** Један третман у количини од 3 l/ha при порасту стабљике. У случају средњег дефицита поновити третман у фази 4-6 листова и при порасту стабљике. А у случају тешког дефицита поновити третман након 10-14 дана касније, али избегавати третман у фази цветања. Количина воде: 200 l/ha

# Foligal FEED

Bor 150



1L



GALENICA - FITOFARMACIJA

**Течно ђубриво на бази микроелемената**

**Врста и тип:** Неорганско ђубриво са једним микроелементом (B)

**Назив у оквиру типа:** Бор етанол амин

**Назив и садржај хранљивих материја:**

**Бор (B)** ..... 10,8 % / - 0,4%

Физичке особине:

Раствор, жуте боје

Запреминска маса – 1,32-1,42 g/cm<sup>3</sup>

**Начин деловања:**

Foligal Feed Bor 150 садржи бор у облику бор етанол амина Бор у наведеном органском комплексу се олакшано усваја и транспортује унутар биљке, директно утиче на синтезу шећера, што је посебно значајно за повећање дигестије код шећерне репе и побољшава оплодњу и заметање плодова, јер олакшава клијање полена и помаже развиће поленове цевчице.

**Време и начин примене:**

Примена је фолијарна, 1-3 пута у току године у зависности од биљне врсте у којој се примењује.

**РОК УПОТРЕБЕ:** 4 године, ако се правилно складиши. Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

**Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта бр. 321-01-00765/2017-11 од 19.12.2017. године са свим важећим изменама и допунама.**

**ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ:**

**ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.**

Београд, Батајнички друм 66  
тел. 011/ 3072-372

**Увозник i distributer za Bosnu i Hercegovinu**

**GOLIC TRADE d.o.o.**

ul. Romanovci bb  
Gradiška, Bosna i Hercegovina,  
tel. 051/890-200

**Broj dozvole:** Ministarstvo poljoprivrede,  
šumarstva i vodopривреде, R. Srpske br.  
12.03.3-330-734/18 od 26.02.2018.godine.

