

Број третирања у току године: 3-5 пута.

Начин примене:

У системима за фертигацију и фолијарно.

НАПОМЕНА: Не сме се мешати са зимским њљима, бордовском чорбом, сумпорним и алкалним хемикалијама.

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на умереним температурама (5-40° C), на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, лића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

Начин деловања:

Препарат утиче на повећање приноса и квалитета плодова воћа и поврћа. Услед недостатка калцијума, у плодовима јабуке јављају се физиолошки поремећаји који доводе до појаве симптома као што су горке пеге, јонатан пеге и скалд, а код парадајза долази до слабог формирања кутикеле и појаве „сунчанице“ на врховима плодова. Додавање калцијума фолијарним третманом биљака у току раста плодова, омогућава им се нормалан развој, боља структура, обојеност и чврстоћа. Применом препарата Фолигал калцијум побољшава се квалитет плодова, утиче се на дуже чување плодова у складиштима и хладњачама, омогућава се лакши транспорт и повећање укупне тржишне вредности плодова.

Физичке особине:

Течност зелене боје, благог мириса

Запреминска маса 1,5 – 1,6 g/cm³

Препоручена количина, време и начин примене:

Применује се за прихрану различитих биљних врста, на различитим типовима земљишта, осим на земљиштима алкалне реакције.

Применује се у количини од 2-3 l/ha (20-30 ml на 100 m²) у системима за фертигацију и фолијарно преко листа као 0,3% (30 ml/10 l воде) раствор.

Време примене:

• у **ратарству** (жита, кукуруз, шећерна репа, кромпир, дуван, детелина, памук) – прво третирање у фази интензивног пораста. Поновити после 10-15 дана.

• у **повртарству** третирање се врши након цветања и након формирања плодова. Поновити третман након 7-10 дана.

• у **воћарству** (јабука, крушка, бресква, кајсија, вишња, трешња, шљива) – у фази прецветавања и формирања плодова. Поновити третман више пута у периоду од 7-10 дана.

• у **виноградству** препарат применити након формирања бобица. У току вегетационе сезоне препарат применити у неколико наврата, на сваких 10-15 дана.

Foligal FEED

CalMax



300ml



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Течно ђубриво са додатком секундарног елемента и микроелемената

Врста и тип: Неорганско просто течно ђубриво са додатком секундарног елемента и микроелемената

Назив у оквиру типа: Раствор калцијум нитрата

Назив и садржај хранљивих материја:

Азот (N) (0,6% као N-NH ₄ ⁺ ; 8,4% као N-NO ₃ ⁻ и 1% као N-NH ₂)	10%/-0,4%
Калцијум (као CaO)	15,3%/-0,9%
Магнезијум (као MgO)	2,17%/-0,54%
Бор (B)	0,01%/-0,002%
Бакар (Cu)	0,02%/-0,004%
Гвожђе (Fe)	0,02%/-0,004%
Манган (Mn)	0,02%/-0,004%
Молибден (Mo)	0,001%/-0,0002%
Цинк (Zn)	0,006%/-0,0012%

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта број: 321-01-01650/2020-11 од 12.03.2021. године са свим важећим изменама и допунама.

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ:

GALENIKA - FITOFARMACIJA а. д.

Београд, Батајнички друм бб

тел. 011/ 3072-372

РОК УПОТРЕБЕ: 3 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu

GOLIC TRADE d.o.o.

ul. Romanovci bb, Gradiška, Bosna i Hercegovina,

tel. 051/890-200

Број дозволе: Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде Р. Српске

12.03.3-330-988/14 од 10.03.2014. године.



8