

Пажња

Обавештења о опасности: Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Обавештења о мерама предострожности:

Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Избежавати испуштање/ ослобађање у животну средину. АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Исперите са пуно воде. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет/ посматрање. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима. Сакупити просути садржај.

Препоручена количина примене:

Применује се за прихрану различитих биљних врста у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству, на земљиштима дефицитарним цинком или код биљних врста које имају повећану потребу за цинком, на отвореном или у заштићеном простору.

Применује се фолијарно у следећим усевима/засадима:

- Кукуруз: када биљка има 3-8 листова у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 200 l воде, а у случају јаког дефицита поновити третман после 14 дана
- Житарице: када је биљка у фази 2 листа до појаве првог колена у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 200 l воде
- Кромпир: недељу дана након ницања у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 200 l воде
- Лук: када се појави довољно зелене масе за третман у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 200 l воде
- Шећерна репа: када је биљка у фази 4-6 листова у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 200 l воде, а у случају јаког дефицита поновити третман за 2 недеље
- На пашњацима и ливадама за кошење силажног сена: у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 200 l воде када је висина траве 15cm пре сваке следеће косидбе
- Јабука и крушка: у количини од 1-2 l/ha (10-20 ml на 100 m²) на 200-1000 l воде у тренутку кретања пупољака и на крају цветања. Избежавати третман у фази цветања.
- Трешња и шљива: у количини од 1-2 l/ha (10-20 ml на 100 m²) на 500-1000 l воде у фази зимских пупољака, затим у фази цветних пупољака и последњи третман после бербе, а пре опадања лишћа
- Малина: у количини од 0,5 l/ha (5 ml на 100 m²) на 200-500 l воде када је биљка у фази зеленог пупољака
- Јагода: у количини од 0,5 l/ha (5 ml на 100 m²) на 200-500 l воде када је биљка у фази зеленог пупољака, затим још 2 третмана у количини од 0,25 l/ha (2,5 ml на 100 m²) у фази белог пупољака и у фази поновног пораста након бербе.
- Четинари: у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m²) на 500-1000 l воде када крене пораст четина, а други третман рано у јесен.



Foligal FEED

Cink 700



1L



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Течно ђубриво на бази микроелемената

Врста и тип: Неорганско ђубриво са једним микроелементом

Назив у оквиру типа: Суспензија ђубрива са цинком

Назив и садржај хранљивих материја:

Цинк (Zn) 40% / - 0,4%

Физичке особине:

Суспензија, беле боје, благог мириса.

Запреминска маса – 1,75-1,85 g/cm³

pH 7,5-8,5

Начин деловања:

Foligal Feed Cink 700 због садржаја цинка који је кључна компонента многих ензима и протеина има важну улогу у широком спектру физиолошких процеса у биљкама. Цинк представља кључни фактор у синтези ауксина који имају улогу у регулацији раста биљке. Цинк је слабо покретљив у биљци и веома добро се усваја фолијарним путем.

Време и начин примене:

Примена је фолијарна, 1-3 пута у току године у зависности од биљне врсте у којој се применује.

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на умереним температурама (5-40°C), на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

РОК УПОТРЕБЕ: 4 године, ако се правилно складишти.

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р.Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта бр. 321-01-01076/2017-11 од 17.05.2017. године са свим важећим изменама и допунама.

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд, Батајнички друм бб

тел. 011/ 3072-372

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu

GOLIĆ TRADE d.o.o.

ul. Romanovci bb

Gradiška, Bosna i Hercegovina,

tel. 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br.

12.03.3-330-4106/17 od 19.10.2017. godine.



8