

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације. При раду са препа- ратом придржавати се општих мера хигијенско-техничке заштите.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе.

Чувати ван домаћаја деце и непућених особа.

Препоручена количина примене:

Примењује се за прихрану различитих биљних врста у воћарству, ратарству и повртарству, на земљиштима дефицитарним манганом, на отвореном или у заштићеном простору.

Примењује се у следећим усеви/засадима:

- **Јабука, крушка:** 1l/ha при опадању лисних дршки, а у случају тешког дефицита непосредно пред цветање. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Трешња, шљива:** 1l/ha у тренутку земања плодова. У случају да је потребно поновити третман 10-14 дана касније. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Јагода (на отвореном):** 1 l/ha у фази зеленог пупољка. Количина воде: 200-500 l/ha
- **Пасуљ, грашак:** 1l/ha у фази 4-6 листова (у случају дефицита приноса) и на почетку и крају цветања (када се појаве карактеристичне пеге за недостатак мангана). Количина воде: 200 l/ha
- **Кромпир:** 1 l/ha недељу дана након ницања свих биљака. У случају средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Мрква:** 1 l/ha када је биљка висине 15 cm. У случају средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Кељ, броколи, прокељ, купус, карфиол:** 1 l/ha у фази 4-6 листова. У случајевима средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Кукуруз:** 1 l/ha у фази 4-6 листова. У случајевима средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Уљана репица:** За једну апликацију, 1 l/ha при порасту стабљике. Количина воде: 200 l/ha
- **Шећерна репа, сточна репа и бела репа:** 1 l/ha у фази 4-6 листова. У случају средњег до тешког дефицита поновити третман у интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha

Foligal FEED

Man 500



1L



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Течно ђубриво на бази микроелемената

Врста и тип: Неорганско ђубриво са једним микроелементом (Mn)

Назив у оквиру типа: Суспензија ђубрива са манганом

Назив и садржај хранљивих материја:

Манган (Mn) 27,4%/-0,4%

Физичке особине:

Суспензија, крем боје
Запреминска маса – 1,75-1,90 g/cm³

Начин деловања:

Foligal Feed Man 500 је средство за исхрану биља са високим садржајем мангана. Манган учествује у усвајању азота и синтези органских киселина, а укључен је у различите биохемијске процесе као што су фотосинтеза, дисање, ензимска активација. Манган утиче и на зрење полена, развој тучка и издуживање корена. Физиолошки појачава отпорност биљке на земљишне патогене.

Време и начин примене:

Примена је фолијарна и у системима за фертигацију 1-3 пута у току године у зависности од биљне врсте у којој се примењује.

РОК УПОТРЕБЕ:

2 године, ако се правилно складишти.
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплеменјивача земљишта бр. 321-01-00763/2017-11 од 12.12.2017. године са свим важећим изменама и допунама.

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд, Батајнички друм 66

тел. 011/ 3072-372

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu

GOLIĆ TRADE d.o.o.

ul. Romanovci bb

Gradiška, Bosna i Hercegovina,

tel. 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede R. Srpske br.

12.03.3-330-733/18 od 26.02.2018. godine.



8