
ПАЖЊА



Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са

Супстанце које доприносе класификацији: teflutrin

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средстава за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

TOCEGHE ADALTHE OSHAKE GESGEAHOCTU SA KOPUCHUKE:

SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Spe 5 Због заштите птица/дивљих врста сисара средство за заштиту биља се мора применити уз инкорпорацију у земљиште, укључујући и крајње редове.

Spe 6 Због заштите птица/дивљих врста сисара, расуто средство за заштиту биља треба уклонити.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: Препарат се примењује инкорпорацијом истовремено са сетвом. Оператери и радници треба да носе заштитна одела (са дугачким ногавицама и рукавима), рукавице, наочаре и/или штитник за лице. Оператери треба да носе и одговарајући респиратор, а радници маске са филтером за честице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. Избегавати додир са кожом и слузницама. После завршетка рада руке и лице добро опрати и истуширати се. Контаминирано радно одело после примене скинути и пре поновне употребе опрати.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у

неке друге сврхе! ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

поступање у случајевима испуштања средства за заштиту биља у животну средину: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.
Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе

GALITION[®]ULTRA

Инсектицид у облику гранула- GR



САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

Генерички назив: — TEFLUTRIN

Хемијски назив: — 2,3,5,6-tetrafluor-4-metilbenzil (Z)-(1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-hlor-

3,3,3-trifluorprop-1-enil]-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat

GRUPA 3A INSEKTICID

 Садржај:
 5 ± 1,25 g/kg

 Техничка чистоћа: – мин. 92 %

 САЅ број:
 79538-32-2

производи и извози:

Галеника-Фитофармација а.д.

Београд, Батајнички друм бб,

Тел. +381 11 3072 372

ПРИМЕНА: GALITION ULTRA је несистемични инсектицид са контактним и инхалационим деловањем, који се користи у усевима парадајза и кромпира, за сузбијање ларви жичњака (*Agriotes spp.*)

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40° C) на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домашаја деце, нестручних особа и животиња.

РОК УПОТРЕБЕ: 4 године, ако се правилно складишти. Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ.

1 kg



ПРИМЕНА: GALITION ULTRA је несистемични инсектицид са контактним и инхалационим деловањем који се користи у усевима парадајза и кромпира, за сузбијање ларви жичњака (Agriotes spp.). Примењује се истовремено са садњом, депозиторима за грануле, у количини од 12-15 kg/ha (120-150

Максималан број третирања у току године на истој површини: једном.

НАПОМЕНЕ: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва. На третираним површинама не дозволити приступ домаћим животињама најмање 28 дана од

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На организме у води (токсичност): Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у текуће и стајаће воде и канализациону мрежу.

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију површинских вода (водотока, језера, бунара, изворишта вода и водоснабдевања), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПРЕПАРАТИМА: Пре мешања с другим препаратима проверити њихову коматибилност.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе, односно жетве): Обезбеђена временом примене за парадајз и кромпир.

РАДНА КАРЕНЦА: Један дан

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми: Након оралних тровања могу се јавити: мучнина дијареја, повраћање, болови у трбуху, улцерација у усној дупљи, бол при гутању, главобоља, вртоглавица, замагљен вид, атаксије, тремори и фибрилације мишића, док су код тровања тежег степена могуће и конвулзије, брадикардија и повећања ексцитабилност миокарда. Након инхалационе изложености могу се јавити различите алергијске манифестације, као што су алергијски ринитис, спастични бронхитис, пнеумонитис, а у најтежим случајевима могући су кома и анафилактички шок. Дермална изложеност може бити праћена сврабом, алергијским дерматитисом, црвенилом папулама и булама, уз парестезије које се обично повлаче од 12-24 сата.

Прва помоћ: У случлају инхалације затрованог извести на свеж ваздух и обратити се лекару. У случају ингестије, ако је затровани у свесном стању дати му да попије 2-3 чаше воде и обратити се лекару. У медицинској установи спроводити лаважу уз заштиту дисајних путева, а после се може дати медицински угаљ. Уколико препарат доспе на кожу, скинути контаминирану одеђу, а контаминирану површину добро опрати водом и сапуном. У случају појаве контактног дерматитиса консултовати дерматолога. Уколико дође до контаминације очију извршити испирање са доста воде у трајању од 15 минута. Претходно уклонити контактна сочива, уколико постоје. По потреби обратити се лекару, специјалисти за очи.

За препарат GALITION ULTRA не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна. У случају потребе за савет (детаљнија упутства) обратити се Националном центру за контролу тровања, ВМА, Београд (телефон: 011-360-84-40).

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-1784/2020-11 од 29.09.2021. године са свим важећим изменама и допунама.

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: GOLIĆ TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb, tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srpske broj 12.03.3-330-3340/21 od 02.02.2022. godine.





P BlackC

White