



**ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ:** Токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.

**ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:** Избегавати испуштање/ослобођање у животну средину. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.

**Супстанце које доприносе класификацији:** fluopiram.

**Садржи** 2,2,2"-*(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)* trietanol. Може да изазове алергиску реакцију.

**ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ:** SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

**ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ:** SP02 После примене средства за заштиту биља отпрати заштитну одећу.

**СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ:** Средство чувати у хладном и сувом простору, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереној температури (5-40°C) одвојено од хране, пића и хране за животиње и спречити приступ деци и неупућеним особама.

# Insajder®

## Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC



FUNGICID

11

### САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA C2 FUNGICID

#### Активна супстанца:

Генерички назив: FLUOPIRAM  
Хемијски назив: (N-[2-(3-hloro-5-(trifluorometil)-2-piridil)-a,a-trifluoro-orto-toluamid]

Садржај: 500 ± 25 g/l

Техничка чистоћа: мин. 96 %

CAS број: 658066-35-4

#### ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд, батајнички друм бб

тел. 011/3072-372

#### ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЛЮДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! ПРЕ ПРИМЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ! ПРОМОУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

**ПРИМЕНА:** INSAJDER је системични фунгицид са протективним и куративним деловањем, намењен за сузбијање проузроковача пепелнице (*Podosphaera leucotricha*) и прозроковача чајаве легавости листа и краставости плода (*Venturia inaequalis*) третирањем од почетка бубрежа цветних пупољака до почетка зрења плодова (фазе 51-81 BBCH скале). Концентрација примене: 0,03-0,04% (3-4 ml у 10 l воде) за сузбијање *Podosphaera leucotricha* и 0,04-0,05% (4-5 ml у 10 l воде) за сузбијање *Venturia inaequalis*.

**Урошак воде:** 600-1000 l/ha (6-10 l на 100 m<sup>2</sup>).

**Максималан број третирања на истој површини у току године:** Највише два пута са размаком између третирања од 7-10 дана у засаду јабуке и од 12-14 дана у засаду винове лозе.

#### НАЧИН ПРИМЕЊЕ:

Фолијарно прскањем.  
**НАПОМЕНА:** Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

**ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕЊУ:** Средство за третирање се припрема уливашем у танком млазу, одмерене количине препарата у потребну количину воде уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање.

#### Дозвола за промет Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде

Р. Србије бр. 321-01-01391/2023-11 од

04.03.2024. године.



GALENIKA - FITOFARMACIJA

**ФИТОТОКСИЧНОСТ:** Није фитотоксичан, ако се примењује према упутству за употребу.

**МОГУЋНОСТ МЕШАЊА (КОМПАТИБИЛНОСТ) ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:** Пре мешања са другим препаратима проверити њихову физичку компатибилност.

**НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:**

**На воде (контаминација):** Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

**На организме у води (токсичност):** Токсично за живи свет у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

**КАРЕНЦИЈА** (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 28 дана за јабуку, 21 дан за винске сорте грожђа и 3 дана за стоне сорте грожђа

**РАДНА КАРЕНЦИЈА** (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): 6 часова.

**СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:**

**Симптоми и знаци тројања:** У контакту са очима доводи до благе иритације са појачаним сузењем и хиперемијом коњуктива. У контакту са кожом изазивају иритативне ефекте са црвенилом и сврбом, а удисање је праћено сувим надражайним кашљем и отежаним дисањем. Након ингестије доводе до мучине, повраћања, опште слабости и малаксалости.

**Прва помоћ и лечење:** Након удисања изнети експонирану особу на чист ваздух. Након контакта са кожом скинути контаминирану одећу, кожу обилно испрати водом и сапуном. Уколико дође до контакта са очима, обилно испрати очи водом у трајању од 15 минута. Пре тога уклонити контактна сочива, уколико постоје. Након ингестије, уколико је особа свесна и сарађује, испрати уста и дати да попије 2-3 чаше воде. Лаважу спроводити уз консултацију токсиколога, у болничким условима код ингестије потенцијално смртне дозе, у року од сат времена од ингестије. Уколико постоји поремећај свести, потребна је интубација због заштите

дисајних путева. Након тога дати медицински угља. Не постоји специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна. У случају тројања, за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тројања ВМА, Београд, Црнотравска 17. тел. 011/3608-440.

**ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:** При раду са овим препарatom треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада, руке и лице добро опрати водом и сапуном и исуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

**ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ:** Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатак од испирани утроши при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима производа поступати у складу са регулативама из области управљања отпадом.

**Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

**ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:**

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;

3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;

4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

**ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕЊУ:** Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третирању површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај

за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

**ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:** Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ:** Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:** Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посuti ајсолбенском (песак, пильевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергентом која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

Insajder®