



25mm

80mm

210mm

80mm

35mm

20mm



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Може да поспеши пожар; оксидујуће средство.
ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење. Чувати даље од одеће и других запаљивих материјала. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. У случају пожара: Користити за гашење CO₂, прах за гашење или водени шмрк. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта број:
321-01-02170/2019-11 од 11.02.2020. године.

Број шарже:
Паковање: 1 kg
Рок употребе: 2 године

Упаковао:
ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Батајнички друм бб
11080 Београд

Назив и адреса произвођача:
K+N EFTHYMIADIS S.A. Greece
Industrial Area of Thessaloniki,
P.O.Box 48, 570 22 Sindos, Greece
Тел: +30231 0 568656

Увозник и дистрибутер :
ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Батајнички друм бб
11080 Београд
Тел: 011/3072-372



GALENIKA - FITOFARMACIJA



8 605020 807282

MURTONIK

19-9-27

Неорганско сложено
чврсто NPK ђубриво са
микроелементима
(B, Cu, Fe, Mn, Zn)

1 kg

K&NE
EARTH MATTERS**Врста и тип:**

Неорганско сложено чврсто NPK ђубриво са микроелементима (B, Cu, Fe, Mn, Zn)

Назив у оквиру типа:

Мешано NPK ђубриво

Назив и садржај**хранљивих материја:****Садржај макроелемената:**

Азот (N) ... 19% /-1,1%

Фосфор P (P₂O₅) ... 9% /-1,1%

Калијум K (K₂O) ... 27% /- 1,1%

Садржај микроелемената:

Бор (B) ... 0,01% /-0,002%

Бакар (Cu) ... 0,02% /-0,004%

Гвожђе (Fe) ... 0,035% /-0,007%

Манган (Mn) ... 0,02% /-0,004%

Цинк (Zn) ... 0,006% /-0,0012%

Физичке особине:

Ситни кристали, плаве боје, без мириса.

Садржај влаге max 2%

Гранулометрички састав:

< 2mm – min 80%

Запреминска маса: 0,8-0,9 g/ml

Препоручена количина, време и начин

примене: Примењује се за исхрану свих пољопривредних култура на свим типовима земљишта на отвореном пољу или у заштићеном простору. Примењује се фертигацијом у количини 50-150 kg/ha годишње, у концентрацији 0,5-2,5 g/l воде и фолијарно у количини 2-3 kg/ha по третирању (максимална концентрација раствора за прскање 0,15-0,2%, односно 0,15-0,2 kg ђубрива у 100 l воде за третирање), од средине вегетације - од момента формирања плодова, па све до бербе. У ратарству и повртарству се примењује 3-5 пута, у воћарству 2-3 пута и у виноградарству 2-4 пута годишње.

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско техничке заштите. Препарат складиштити у затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

250mm

20mm