

25mm

80mm

210mm

80mm

35mm

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на умереним температурама (5-40°C), на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге и у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа. Не мешати са ђубривима и средствима за заштиту биља без претходне провере компатибилности.

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплеменјивача земљишта број: 321-01-00008/2022-11 од 18.01.2022. године.

Број шарже:
Рок употребе: 2 године
Паковање: 1 кг

Упаковао:
ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Батајнички друм бб
11080 Београд

Назив и адреса произвођача:
K+N EFTHYMIADIS S.A. Greece
Industrial Area of Thessaloniki,
P.O.Box 48, 570 22 Sindos, Greece
Тел: +30231 0 568656

Увозник и дистрибутер :
ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Батајнички друм бб
11080 Београд
Тел: 011/3072-372



8 605020 811234

MURTONIK GOLD**20-20-20**

Неорганско
сложено
чврсто NPK
ђубриво са
микроелементима
(B, Cu, Fe, Mn, Zn)

1 kg

Врста и тип: Неорганско сложено чврсто NPK
ђубриво са микроелементима (B, Cu, Fe, Mn, Zn)
Назив у оквиру типа: Мешано NPK ђубриво

Назив и садржај хранљивих материја:*Садржај макроелемената:*

Азот (N) 20% /-1,1%
Амонијачни (NH₄-N) 4%
Нитратни (NO₃-N) 5,6%
Амидни (N-NH₂) 10%
Фосфор (као P₂O₅) 20%/-1,1%
Калијум (као K₂O) 20%/-1,1%

Садржај микроелемената:

Бор (B) 0,01%/-0,002%
Бакар (Cu) 0,02%/-0,004%
Гвожђе (Fe) 0,035%/-0,007%
Манган (Mn) 0,02%/-0,004%
Цинк (Zn) 0,006%/-0,0012%

Физичке особине: Кристали, плаве боје,
карактеристичног мириса.

Препоручена количина, време и начин примене:

Може се користити уи производњи ратарско-повртарских усева и производњи воћа и винове лозе, као и осталих пољопривредних култура на свим типовима земљишта.

Примењује се фертигацијом у количини 50-250 kg/ha по сезони, раствором концентрације до 0,1% и фолијарно у количини од 150-200 g у 100 l воде за прскање, односно раствором концентрације 0,15-0,2%.

Време примене:

- у првој половини вегетације - ратарски усеви
- у фази развијања цветних пупољака - воће
- 10-15 дана после расађивања - поврће
- од момента кретања вегетације - винова лоза и хортикултура

Третирање код свих култура поновити након 10-15 дана.

Број третирања у току године: 1-5 пута током вегетације

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско техничке заштите.

25mm

230 mm

280 mm

25mm