

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ:

Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај производа заостао у амбалажи. Са остацима биоцидног производа поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС 36/09, 88/10, 14/16), а са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. Гласник РС 36/09). **Забрањено је поновно коришћење амбалаже биоцидног производа или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да производ доспе у животну средину. Не испустити средство у канализацију, површинске и подземне воде.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ КОД ПРЕВОЗА: Ако у току транспорта дође до расипања препарата услед хаварије превозног средства и сл., превозник је дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање препарата, да о томе одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или најближу станицу милиције и да до њиховог доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити да производ доспе у водотоке и околну вегетацију прављењем баријера и засипањем земљом или песком.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Уколико дође до расипања производа у затвореном простору, онемогућити загађење осталих производа у тој просторији засипањем земљом или песком. Ако се производ нађе у пожару, могу се развити токсични гасови. За почетно гашење пожара користити апарате с ознаком S – апарат за гашење прахом. У оба случаја сакупити просуто средство у контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање отпада.

MUVER®

Инсектицид у облику вододисперзибилних гранула – WG



INSEKTICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

- Активна супстанца: **Tiametoksam**
- Садржај: **100 g/kg**
- CAS број: **153719-23-4**

- Активна супстанца (атрактант): **cis-trikoz-9-en**
- Садржај: **0,5 g/kg**
- CAS број: **27519-02-4**

ПРИМЕНА: MUVER је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем, који се користи за сузбијање одраслих облика мува (*Musca domestica* - кућна мува и *Stomoxys calcitrans* - стајска мува). Примењује се у затвореном простору, у објектима где се домаће животиње држе и чувају, у облику воденог раствора, премазивањем површина, на тај начин што се на сваких 100 m² површине, на местима где се муве скупљају, премаже минимум 20 "спотова" димензије 10x30 cm. Потребно је растворити 100 g препарата у 80 ml млаке воде, што је довољно за третирање укупне површине објекта од 40 m² или за површину зидова/плафона од 80-120 m².

ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО ПРЕ УПОТРЕБЕ!

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.
Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб,
тел.: 011/ 3072-372

За Галеника-Фитофармација а.д., Psyche Chemicals Co., Ltd., Кина

Решење за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа Министарства заштите животне средине Р. Србије број: 532-01-618/2017-03 од 14.03.2018. године и са свим важећим изменама и допунама.



GALENIKA - FITOFARMACIJA

400g

НАПОМЕНЕ: Не наносити производ на површине доступне животињама за лизање и не дозволити приступ животињама на третиране површине док површина не остане сува. Не наносити директно на прехранбене, пољопривредне производе и сточну храну. Производ чувати одвојено од хране, пића и сточне хране. Површине третиране биоцидним производом чувати ван домаћаја деце, кућних љубимаца и других животиња.



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Избегавати испуштање/ ослобађање у животну средину. Сакупити просути садржај. Одлагање садржаја/ амбалаже у скалду са националним прописима.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми и знаци: Може доћи до појаве неких општих симптома код пероралног уноса, малаксалост, мучнина, повраћање, појачано знојење, болови у трбуху, тремор, мишићна слабост, укључујући и слабост респираторних мишића, што се манифестује отежаним дисањем.

Прва помоћ: Након инхалације обезбедити свеж ваздух. Консултовати лекара у случају тегоба. После контакта са кожом, кожу одмах опрати водом и сапуном и темељно испрати. У случају контакта са очима, испирати отворене очи неколико минута под млазом воде. После ингестије, ако симптоми потрају, консултовати лекара.

У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662-381 или 3608-440.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Биоцидни производ складиштити у оригиналној, добро затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране. Држати под кључем, ван домаћаја деце и животиња.

