

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: Размотрити превентивне мере контроле како би олакшали примену производа и смањили ризик од поновне заразе (нпр. затворити могуће отворе, уклонити потенцијалне изворе хране и пића што је више могуће). Не стављати кутије са мамцима близу система за одводњавање јер мамак може доћи у контакт са водом. Током провере постављених клопки, проверити и присуство мртвих глодара и уклонити их током третмана. Глодари могу бити преносиоци болести, не додиривати мртве глодаре голим рукама.

За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: На крају третмана, неупотребљене мамке и амбалажу одложите у складу са важећом законском регулативом. Са остацима биоцидног производа поступати у складу са регулативама из области управљања отпадом. Забрањено је поновно коришћење амбалаже или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!



Датум производње и број шарже

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ: RATOMIDE PASTA је родентицид у облику меког мамка, на бази активне супстанце бродифакум, из групе антикоагуланата. Садржи атрактанте који привлаче глодаре, и примамљивији је од доступне хране. Наменен је за општу употребу, за сузбијање кућног миша (*Mus musculus*) у затвореном простору, и за сузбијање сивог пацова (*Rattus norvegicus*) у затвореном простору и око објекта.

RATOMIDE PASTA садржи битрех градиво које ствара спречавање случајног гутања код деце и одбојност код домаћих животиња.

НАЧИН ПРИМЕНЕ:

У затвореном простору:

- За сузбијање кућног миша (*Mus musculus*): поставити 20-40 g родентицида **RATOMIDE PASTA** у кутијама за мамке (1-2 кесице од 20 g или 2-4 кесице од 10 g). Кутије за мамке поставити на минималну удаљеност од 5 метара, за већи број на удаљеност од око 10-15 метара. На почетку кутије треба проверавати на свака 2-3 дана, касније једном недељно. Мамке обнављати по потреби.

- За сузбијање сивог пацова (*Rattus norvegicus*): поставити 100-200 g родентицида **RATOMIDE PASTA** у кутијама за мамке (5-10 кесице од 20 g или 10-20 кесице од 10 g). Кутије за мамке поставити на минималну удаљеност од 5 метара, за већи број кутија на удаљеност од око 5-10 метара. Кутије за мамке треба проверавати на сваких 5-7 дана на почетку третмана, касније једном недељно. По потреби обновити мамке.

На отвореном, око објекта:

- За сузбијање сивог пацова (*Rattus norvegicus*) поставити 100-200 g родентицида **RATOMIDE PASTA** у кутијама за мамке (5-10 кесице од 20 g или 10-20 кесице од 10 g). Кутије поставити на минималну удаљеност од 5 метара, за већи број клопки на удаљеност од око 5-10 метара. Кутије са мамцима поставити на површине које нису влажне и подложне квашењу. Мамке заменити уколико дође до оштећења (квашења, прљања..).

Кутије за мамке треба проверавати на сваких 5-7 дана на почетку третмана, касније једном недељно. По потреби обновити мамке.



GALENIKA - FITOFARMACIJA



RATOMIDE PASTA

РОДЕНТИЦИД У ОБЛИКУ
МЕКОГ МАМКА



150g

ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО ПРЕ УПОТРЕБЕ!

НАПОМЕНЕ: Непосредно пре третмана не чистити нападнуто подручје, јер то узнемирава популацију глодара и отежава прихватање мамака. Уклонити додатне изворе хране којима глодари могу лако приступити (нпр. семе кукуруза или остатке од хране). Кутије са мамцима треба поставити у непосредној близини места на којима је претходно потврђена активност глодара. Производ држати ван домаћаја деце, птица, кућних љубимаца, домаћих животиња и других нециљаних животиња. Држати производ даље од хране, пића и хране за кућне љубимце, као и од алата или површина које могу доћи у контакт са производом.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми и знаци: Овај производ садржи антикоагулантну супстанцу. Ако се прогута, симптоми који могу бити одложени, могу укључивати крварење из носа или десни. У озбиљним случајевима могу се јавити модрице и крв у фецесу и урину.

Прва помоћ: После контакта са кожом, кожу одмах опрати водом и сапуном и темељно испрати. У случају контакта са очима, испирати отворене очи неколико минута под млазом воде. После ингестије, испрати уста водом, не изазивати повраћање. Одмах консултовати лекара. У случају да их прогута кућни љубимац, обратите се ветеринару.

Антидот: Витамин К1 (примењен од старне медицинског/ветеринарског особља).

У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултовати Национални центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662 –381 или 3608-440.

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Brodifakum 0,0025 %
(CAS 56073-10-0)

Denatonium benzoat 0,001 %
(CAS 3734-33-6)



ПАЖЊА

Може да доведе до оштећења органа (крв) услед дуготрајног или виšekратног излагања

Чувати ван домаћаја деце. АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати центар за контролу тровања/лекара. У случају излагања или забринутости: потражити медицински савет/посматрање. Одлагање садржаја/ амбалаже у склду са националним прописима.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Биоцидни производ складиштити у оригиналној, добро затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране. Држати ван домаћаја деце, птица, кућних љубимаца, домаћих животиња и других нециљаних животиња.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти.


Датум производње и број шарже утиснут на амбалажи.

Решење за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа Министарства заштите животне средине Р. Србије број 532-01-222/2021-03 од 15.04.2021. године.

ПРОИЗВОДИ:

Colkim S.r.l. Via Piemonte, 50
40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italy - Tel. +39 051/799-445

УВОЗНИК И ДИСТРИБУТЕР:



ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм 66, Србија - Тел. 011/3072-372