



25

80

210

80

35

Број третирања у току године: 1-2 пута током вегетације

Начин руковања и складиштење:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације. При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско техничке заштите.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на умереним температурама (5-40°C), на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге и у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

Величина паковања: 1 kg

Рок употребе: 5 година

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплеменењивача земљишта број: 321-01-01741/2022-11 од 04.10.2022. године.

Назив и адреса произвођача:

ANOREL NV

Lintsesteenweg 632

2540 Hove, Belgium

Tel.: +32 3 488 02 33

Увозник и дистрибутер:

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм бб

11080 Београд

Тел: +381 11 30 72 372

Упаковао:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм бб

11080 Београд

Тел: +381 11 30 72 372

SOLUGAL START

11-40-11 + ME



1kg



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Врста и тип: Неорганско сложено чврсто ђубриво са секундарним елементом и микроелементима

Назив у оквиру типа: Мешано NPK ђубриво

Садржај хранљивих елемената:

Азот (N) 11 % / -1,1%

Фосфор (као P₂O₅) 40 % / -1,1%

Калијум (као K₂O) 11 % / -1,1%

Садржај секундарних елемената:

Магнезијум (као MgO) ... 2%/-0,5%

Садржај микроелемената:

Бор (B) 0,01%/-0,002%

Бакар (Cu) 0,01%/-0,002%

Гвожђе (Fe) 0,02%/-0,004%

Манган (Mn) 0,01%/-0,002%

Молибден (Mo) 0,001%/-0,0002%

Цинк (Zn) 0,01%/-0,002%

Физичке особине: Кристали, беле боје

Препоручена количина, време и начин примене:

Може се користити у производњи свих пољопривредних култура на свим типовима земљишта, посебно на земљиштима сиромашним у фосфору, на отвореном пољу и у заштићеном простору. Примењује се фертигацијом у количини 50-300 kg/ha, раствором концентрације до 0,1% и фолијарно раствором концентрације 0,3-0,5%.

Примењује се почетком вегетације.

Ограничење у примени:

Не мешати са другим ђубривима и средствима за заштиту биља без претходне провере компатибилности.



8 605020 815812