

Број третирања у току године: 1-4 пута у току вегетације.

Начин руковања и складиштење:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације.

При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско техничке заштите. Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван домаћаја деце и неупућених особа.

Величина паковања: 1 kg

Рок употребе: 5 година

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта број: 321-01-01738/2022-11 од 10.10.2022. године.

Назив и адреса произвођача:

ANOREL NV

Lintsesteenweg 632

2540 Hove, Belgium

Tel.: +32 3 488 02 33

Увозник и дистрибутер:

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм 66

11080 Београд

Тел: +381 11 30 72 372

Упаковао:

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм 66

11080 Београд

Тел: +381 11 3072 372

SOLUGAL VEGETATIVE

24-10-10 + 2 MgO + ME



GALENIKA - FITOFARMACIJA

1kg

Врста и тип: Неорганско сложено чврсто ђубриво са секундарним елементима и микроелементима

Назив у оквиру типа: Мешано NPK ђубриво

Садржај хранљивих елемената:

Азот (N) 24 % / -1,1%

Фосфор (као P₂O₅) 10 % / -1,1%

Калијум (као K₂O) 10 % / -1,1%

Садржај секундарних елемената:

Магнезијум (као MgO) 2%/-0,5%

Сумпор (као SO₃) 18,9%/-0,9%

Садржај микроелемената:

Бор (B) 0,011%/-0,0022%

Бакар (Cu) 0,011%/-0,0022%

Гвожђе (Fe) 0,022%/-0,0044%

Манган (Mn) 0,011%/-0,0022%

Молибден (Mo) 0,001%/-0,0002%

Цинк (Zn) 0,011%/-0,0022%

Физичке особине:

Кристали, беле боје, без мириса

Препоручена количина, време и

начин примене: Може се користити за

исхрану свих биљних култура на свим

типовима земљишта. Примењује се

фертигацијом у количини 150-300 kg/ha

и фолијарно у количини 3-10 kg/ha по

третману, односно раствором

концентрације 0,5-1,5%.

Примењује се током вегетације.

