



ПАЖЊА

ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ: Може да изазове алергијске реакције на кожи. Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод. Може да доведе до оштећења тимус жлезди и крви услед дуготрајног или вишестратног излагања. Токсично по живи свет у води, са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Прибавити посебна упутства пре употребе. Не удисати прашину/ дим/ гас/ маглу/ пару/ спреј. Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштиту за очи/ заштиту за лице. Ако дође до излагања или се сматра да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/ посматрање. Складиштити под кључем. Одлагање садржаја/ амбалаже у складу са националним прописима.

Супстанце које доприносе класификацији: *cimoksanil, 2,2,2-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol*

ОПШТЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: SP1 Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ПОСЕБНЕ ДОДАТНЕ ОЗНАКЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ: SPo2 После примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу.

VOKAL® C

Фунгицид у облику концентроване суспензије – SC



FUNGICID

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

GRUPA 27 FUNGICID

Активна супстанца:

Генерички назив: Cimoksanil

Хемијски назив (IUPAC): 1-[(E)-2-ciano-2-metoksi-imino-acetil]-3-ethylurea

Садржај: 120 ± 7,2 g/l

Техничка чистоћа: min. 97%

CAS број: 57966-95-7

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а. д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб
тел. 011/ 3072-372

ПРИМЕНА: VOKAL C је системични фунгицид са протективним и куративним деловањем, који се примењује за сузбијање проузроковача пламењаче (*Phytophthora infestans*) у усеви кромпира и парадајза.

РОК УПОТРЕБЕ: 2 године, ако се правилно складишти. Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ. ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

11



GALENIKA - FITOFARMACIJA

ПРИМЕНА: VOKAL C је системични фунгицид са протективним и куративним деловањем, који се примењује у:

Усеви кромпира за сузбијање проузроковача пламењаче (*Phytophthora infestans*) третирањем током вегетације, превентивно, односно по појави првих симптома, а пре стицања услова за ширење обољења.

Усеви парадајза за сузбијање проузроковача пламењаче (*Phytophthora infestans*) третирањем превентивно током интензивног пораста или најкасније по појави првих симптома, а пре стицања услова за ширење обољења (фазе 19-79 ВВСН скале). **Количина примене:** 0,8-1 l/ha (8-10 ml на 100 m²).

Утрошак воде: 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m²) у усеви кромпира и 200-600 l/ha (2-6 l на 100 m²) у усеви парадајза.

Максималан број третирања на истој површини у току године: Највише четири пута у току једне вегетационе сезоне.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Фино прскање.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Средство за третирање се припрема уливањем у танком млазу, одмерене количине препарата у резервоар прскалице претходно до половине напуњен водом, затим допунити резервоар водом и добро промешати.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: Није дозвољено.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Препарат Vokal C није фитотоксичан, ако се примењује према упутству за употребу.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Препарат Vokal C се може мешати са већим бројем других препарата, ако са становишта практичне примене за то постоји потреба. Не сме се мешати са супстанцама изразито алкалне реакције. Пре евентуалног мешања препарата Vokal C са другим пестицидним формулацијама, пожељно је проверити њихову компатибилност.

Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-1994/2019-11 од 17.02.2021. године са свим важећим изменама и допунама.



8 605020 814150

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера, изворишта вода и водоснабдевања) дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

На организме у води (токсичност): Токсичан за организме у води. Спречити доспевање препарата у воде (водотоци, бунари, језера, изворишта вода и водоснабдевања) и канализациону мрежу. Може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе/жетве): 7 дана за кромпир и парадајз

РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): До сушења депозита.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:

Симптоми и знаци тровања: Након оралних тровања могу се јавити повраћање, малаксалост, мучнина, поспаност, сузење, тортколис, блага иритација коже и слузница очију. У тровањима тежег степена јављају се грчеви и отежано дисање. Контакт са очима може евентуално довести до веома благог црвенила конјунктива са појачаним сузењем, а контакт са кожом до појаве веома благе иритације. У поновљеном контакту са кожом може се јавити алергијска реакција.

Прва помоћ и лечење: У случају инхалације, затрованог извести на свеж ваздух. У случају ингестије, ако је особа свесна дати јој да попије 2-3 чаше воде и обратити се лекару. У медицинској установи урадити лаважу желуца (уз заштиту дисајних путева), а после се може дати активни угљ. Уколико дође до контакта са кожом, скинути сву контаминирану одећу, а контаминирану површину добро опрати водом и сапуном и иштуирати се. Уколико дође до контакта са очима, испрати са доста воде, у трајању од 15 минута, с тим да претходно треба уклонити контактна сочива, ако постоје. По потреби се обратити лекару (специјалисти за очи). Не постоји

специфичан антидот. Терапија је симптоматска и потпорна.

У случају тровања, за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, Београд, Црнотравска 17, тел.: 011/3608-440 или 2662-381.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: Радици могу бити изложени током производње и примене средства, као и током поновног уласка у третирана подручја, што се може спречити коришћењем одговарајуће личне заштитне опреме. Трудне жене не би требало да долазе у контакт са препаратом. пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и безбедности. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. Избегавати контакт са кожом посебно са слузницама. После завршетка рада, руке и лице добро опрати и иштуирати се. Контаминирано радно одело после примене скинути, а пре поновне употребе опрати. При одласку у медицинску установу понети етикету производа или амбалажу.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство се мора чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, на умереним температурама (5-40°C), на сувом и прохладном месту, одвојено од хране, пића, хране за животиње и других производа, изван домаћаја деце, нестручних особа и животиња.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утрошити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;

4. Скинути затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ: Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

VOKAL® C